

## Helicobacter-Antigen i. Stuhl

ge  
HPAG

**Probenmaterial:** Stuhl

**Präanalytik:** Karte 'Mikrobiologie-Serologie', Feld 'Sonstige Unters.'  
Therapien mit Antibiotika, Protonenpumpenhemmern und Wismuthpräparaten sollten mindestens zwei Wochen vor der Untersuchung abgesetzt werden.  
Probenmenge: flüssige Stühle: ca. 1 mL, geformete St.: haselnußgroße Probe

**Einheit:** qualitativer Test      **Mindestprobenmenge:**

**Transport:**

**Methodik:** Immunoassay , EIA

### Erläuterungen

*Helicobacter pylori* ist ursächlich an chronischen Gastritiden, Magenulzera, Lymphomen der Magenschleimhaut und dem Adenokarzinom des Magens beteiligt. Man unterscheidet die infizierte Form mit Anzeichen einer Erkrankung von der kolonisierten Form ohne Krankheitszeichen.

Dieser Test weist *Helicobacter Pylori*-Antigen im Stuhl nach, ohne ein aktives Krankheitsgeschehen nachweisen oder ausschließen zu können. Dies ist der klassischen invasiven Diagnostik (Biopsie, Endoskopie) vorbehalten. Er kann zum primären Screening einer *H. pylori*-Besiedlung dienen.

### **Referenzbereich**