

## Varizella zoster-AK Index IgG Serum/Liquor

Analysencode: VARAIG Autor:

**Probenmaterial (System BD Vacutainer)****Probenmaterial (System Sarstedt Monovetten)****Präanalytik:** Zum Nachweis einer intrathekalen Immunglobulinsynthese ist die Berechnung des erregerspezifischen Antikörperindex erforderlich. Hierfür stets Liquor und Serum zeitgleich entnehmen und auf der Anforderungskarte das Feld Schrankenstörung markieren.**Einheit:** **Mindestprobenmenge****Transport:****Methodik:****Erläuterungen**

siehe VZV-AK IgG Serum

Material: Möglichst zeitgleich entnommene Serum- und Liquorprobe.

Antikörperbestimmung zur Berechnung der VZV-spezifischen intrathekalen IgG-Antikörpersynthese

Gleichzeitige Untersuchung von Gesamt-IgG und Albumin im Liquor und Serum (Reiber-Diagramm) wird durchgeführt.

**Referenzbereiche**

|              |                 |       |
|--------------|-----------------|-------|
| pathologisch | $\geq 1,5$      | Index |
| normal       | $< 0,6$ - $1,4$ | Index |

18.01.2012 Dr. O. Colhoun

## **Varizella zoster-AK Index IgG Serum/Liquor**

Analysencode: VARAIG Autor: